

Предупреждение о риске острого панкреатита при применении агонистов рецепторов ГПП-1 и двойных агонистов ГПП-1/ГИП: информация MHRA

Warning of the Risk of Acute Pancreatitis with GLP-1 Receptor Agonists and Dual GLP-1/GIP Receptor Agonists: MHRA Information



Вельц Наталья Юрьевна

Эксперт, аттестованный Минздравом России на право проведения экспертизы лекарственных средств для медицинского применения по специальности «Фармаконадзор»

Заместитель начальника управления экспертизы безопасности лекарственных средств по медицинским иммунобиологическим препаратам ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России

Кандидат биологических наук, доцент

✉ velts@expmed.ru

Анализ информации по безопасности лекарственных препаратов — агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) и двойных агонистов рецепторов глюкозозависимого инсулиотропного полипептида (ГИП) и глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП-1), выявил новую проблему по безопасности, связанную с потенциальным риском серьезных осложнений острого панкреатита¹.

Агонисты рецепторов ГПП-1 (дулаглутид, лираглутид, ликсисенатид, семаглутид) и двойные агонисты рецепторов ГПП-1/ГИП (тирзепатид) применяются для лечения сахарного диабета 2 типа и ожирения. В последнее время частота их применения увеличивается. Пострегистрационное наблюдение выявило редкие случаи тяжелого панкреатита, включая некротический и фатальный, при применении агонистов рецепторов ГПП-1 и двойных агонистов рецепторов ГПП-1/ГИП. Механизм развития острого панкреатита, ассоциированного с данной группой препаратов, до конца не изучен. Наиболее вероятным представляется каскадный процесс, включающий прямое действие на экзокринную

ткань + изменения моторики ЖКТ / желчного пузыря + фактор быстрой потери веса.

По данным британской системы спонтанных сообщений Yellow Card, опубликованным в журнале The BMJ², к августу 2026 г. зарегистрировано 216 сообщений о летальных исходах, подозреваемых в связи с применением агонистов рецепторов ГПП-1 (семаглутид, лираглутид) и двойных агонистов рецепторов ГПП-1/ГИП (тирзепатид). Значительная часть фатальных случаев связана с острым панкреатитом, включая редкие некротизирующие формы. При этом эксперты регуляторных органов подчеркивают, что эти данные отражают подозреваемую, а не доказанную причинно-следственную связь и на фоне миллионов назначений общая польза препаратов при использовании по показаниям продолжает перевешивать риски. Крупные когортные исследования и метаанализы не демонстрируют увеличения общей смертности, а для семаглутиды показывают ее снижение.

Информация о развитии острого панкреатита имеется в общей характеристике лекарственных препаратов (ОХЛП) данных групп,

¹ GLP-1 receptor agonists and dual GLP-1/GIP receptor agonists: strengthened warnings on acute pancreatitis, including necrotising and fatal cases. MHRA: 2026. <https://www.gov.uk/drug-safety-update/glp-1-receptor-agonists-and-dual-glp-1-slash-gip-receptor-agonists-strengthened-warnings-on-acute-pancreatitis-including-necrotising-and-fatal-cases>

² Wise J. GLP-1 deaths: Are weight loss drugs linked to hundreds of fatalities? BMJ. 2026;394:e100557. <https://doi.org/10.1136/bmj-2026-100557>

однако о таких тяжелых осложнениях, как некротический и фатальный панкреатит, информация в ОХЛП отсутствует.

Экспертная консультативная группа по фармаконадзору (PEAG) Комиссии по лекарственным средствам для человека (СНМ) MHRA рекомендовала усилить информирование обо всех агонистах рецепторов ГПП-1 и двойных агонистах рецепторов ГПП-1/ГИП, чтобы подчеркнуть потенциальную опасность острого панкреатита.

Врачи должны проявлять бдительность в отношении возможного панкреатита у пациентов,

получающих лечение агонистами рецепторов ГПП-1 и двойными агонистами рецепторов ГПП-1/ГИП. Раннее распознавание симптомов, указывающих на панкреатит, и своевременное медицинское обследование могут способствовать своевременному вмешательству и снизить риск серьезных осложнений.

Пациентам следует рекомендовать немедленно обратиться за медицинской помощью при появлении сильной постоянной боли в животе, которая может иррадиировать в спину и сопровождаться тошнотой и рвотой.