

<https://doi.org/10.30895/2312-7821-2024-420-tabl6>

Таблица 6. Лекарственные средства с выраженным антихолинергическим действием (по данным [7] с изм.)

Table 6. Drugs with strong anticholinergic properties (adapted from the 2023 Beers Criteria [7])

Антидепрессанты	Антигистаминные ЛС (первого поколения)	Антимускариновые ЛС (при недержании мочи) ^а	Спазмолитики
Амитриптилин Амоксапин* Дезипрамин* Доксепин* (>6 мг/сут) Имипрамин Кломипрамин Нортриптилин* Пароксетин	Бромфенирамин* Гидроксизин Дименгидрилат Дифенгидрамин Доксиламин Меклизин* Прометазин Трипролидин* Хлорфенамин Ципрогептадин	Дарифенацин Оксибутинин Солифенацин Толтеродин Тропия хлорид Фезотеродин Флавоксат*	Атропин Гиосциамин* (гиосцина бутилбромид) Гоматропин* Дицикломин* (дицикловерин) Клидиния бромид + хлордiazепоксид Скополамин*
Противорвотные ЛС	Противопаркинсонические ЛС	Миорелаксанты	Нейролептики
Прометазин Прохлорперазин*	Бензтропин* Тригексифенидил	Орфенадрин Циклобензаприн	Клозапин Оланзапин Перфеназин Хлорпромазин

Таблица адаптирована авторами из источника [7] / The table is adapted from [7]

Примечание. Данная таблица не содержит исчерпывающий перечень препаратов с антихолинергическими свойствами. ЛС — лекарственное средство.

^а Данные о том, оказывают ли некоторые антимускариновые ЛС, используемые для лечения недержания мочи, более серьезное неблагоприятное действие на когнитивные функции, чем другие, недостаточно убедительны. Оксибутинин имеет больше доказательств в отношении развития неблагоприятных эффектов на когнитивные функции. Однако следует соблюдать осторожность в отношении всех антимускариновых ЛС, используемых для лечения недержания мочи, учитывая их потенциальные антихолинергические эффекты.

* ЛС не зарегистрировано на территории Российской Федерации.