<https://doi.org/10.30895/2312-7821-2025-13-2-138-148-tabl>

Таблица 1. Факторы риска развития нежелательных реакций при применении некоторых препаратов в разных популяционных группах (по данным [14])

Table 1. Risk factors for the development of adverse reactions when using certain medicinal product in different population groups (according to [14])

Фактор риска <i>Risk factor</i>	Лекарственный препарат <i>Medicinal product</i>	Нежелательная реакция <i>Adverse drug reactions</i>	Предрасполагающий фактор <i>Predisposing factor</i>
Возраст старше 75 лет <i>Age over 75 years</i>	Цефтриаксон <i>Ceftriaxone</i>	Гепатит <i>Hepatitis</i>	Более длительный период полувыведения препарата <i>Longer half-life of the medicinal product</i>
	Левифлоксацин <i>Levofloxacin</i>	Миоклонус <i>Myoclonus</i>	Наличие в анамнезе почечной недостаточности и заболеваний центральной нервной системы <i>History of renal failure and central nervous system disease</i>
Женский пол <i>Femalegender</i>	Омализумаб <i>Omalizumab</i>	Анафилактический шок <i>Anaphylactic shock</i>	Более высокий уровень эстрадиола в сравнении с пациентами мужского пола <i>Higher levels of estradiol compared to males</i>
Мужской пол <i>Malegender</i>	Афлиберцепт <i>Aflibercept</i>	Тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия легочной артерии <i>Deep vein thrombosis and pulmonary embolism</i>	Более низкая концентрация циркулирующего фактора роста эндотелия сосудов в сравнении с пациентами женского пола при приеме одних и тех же доз препарата <i>Lower circulating vascular endothelial growth factor concentrations compared to females when taking the same doses of the medicinal product</i>
Взрослые с высоким индексом массы тела <i>Adults with high body mass index</i>	Эзомепразол <i>Esomeprazole</i>	Гинекомастия <i>Gynaecomastia</i>	Ингибирование препаратом цитохрома P450 3A4, отвечающего за катаболизм эстрадиола <i>Inhibition of cytochrome P450 3A4, responsible for estradiol catabolism, by the medicinal product</i>
Взрослые с низким индексом массы тела <i>Adults with low body mass index</i>	Селегилин <i>Selegiline</i>	Гипогликемия <i>Hypoglycaemia</i>	Снижение селективности препарата к моноаминоксидазе В из-за повышения его концентрации в крови у данной популяционной группе <i>Decreased selectivity of the medicinal product to monoamine oxidase B due to an increase in its concentration in the blood in this population group</i>
Расовая принадлежность (азиаты) <i>Race (Asian)</i>	Глибенкламид <i>Glibenclamide</i>	Сердцебиение <i>Palpitations</i>	Снижение ферментативной активности изофермента CYP2C9 из-за наличия полиморфизма дефектных аллелей CYP2C9*2 и CYP2C9*3 <i>Decreased pharmacological activity of the CYP2C9 isoenzyme due to the presence of polymorphism of defective alleles CYP2C9*2 and CYP2C9*3</i>

Таблица адаптирована автором из научной публикации / The table is adapted by the author from a scientific publication