

<https://doi.org/10.30895/2312-7821-2025-300-312-tabl>

Таблица 1. Характеристика пациентов, приверженных двойной антитромбоцитарной терапии в первые 6 месяцев после острого инфаркта миокарда ($n=168$)

Table 1. Characteristics of patients adherent to dual antiplatelet therapy during the first 6 months after acute myocardial infarction ($n=168$)

Параметр / <i>Parameter</i>	Значение / <i>Meaning</i>
Демография и антропометрия / <i>Demographics and anthropometrics</i>	
Мужчины, n (%) / <i>Men, n (%)</i>	110 (65,5)
Женщины, n (%) / <i>Women, n (%)</i>	58 (34,5)
Возраст, $M\pm SD$, лет / <i>Age, M\pmSD, years</i>	64,4 \pm 10,7
Индекс массы тела, $M\pm SD$, кг/м ² / <i>Body mass index, M\pmSD, kg/m²</i>	28,2 \pm 4,7
Основное заболевание / <i>Primary disease</i>	
Количество инфарктов миокарда, n (%) / <i>Number of myocardial infarctions, n (%)</i> :	
1	147 (87,5)
2	21 (12,5)
Реваскуляризация миокарда, n (%) / <i>Myocardial revascularisation, n (%)</i>	154 (91,7)
Плановая реваскуляризация после выписки из стационара, n (%) / <i>Elective revascularisation after hospital discharge, n (%)</i>	21 (12,5)
Сопутствующие заболевания / <i>Comorbidities</i>	
Артериальная гипертензия, n (%) / <i>Arterial hypertension, n (%)</i>	159 (94,6)
Хроническая сердечная недостаточность, n (%) / <i>Congestive heart failure, n (%)</i>	89 (53,0)
Хроническая болезнь почек, n (%) / <i>Chronic kidney disease, n (%)</i>	53 (31,5)
Сахарный диабет, n (%) / <i>Diabetes mellitus, n (%)</i>	38 (22,6)
Заболевания органов дыхания, n (%) / <i>Respiratory diseases, n (%)</i>	23 (13,7)
Индекс коморбидности Чарльсона, n (%) / <i>Charlson Comorbidity Index, n (%)</i> :	
1–2 балла / <i>points</i>	22 (13,1)
3–4 балла / <i>points</i>	61 (36,3)
≥ 5 баллов / <i>points</i>	85 (50,6)
Индекс PRECISE-DAPT / <i>PRECISE-DAPT Score</i>	
Низкий/умеренный риск (<25 баллов) / <i>Low/Moderate risk (<25 points)</i>	127 (75,6)
Высокий риск (≥ 25 баллов) / <i>High risk (≥ 25 points)</i>	38 (22,6)
Лабораторно-инструментальная диагностика / <i>Laboratory and instrumental assessment</i>	
Систолическое артериальное давление, $M\pm SD$, мм рт. ст. / <i>Systolic blood pressure, M\pmSD, mmHg</i>	128,7 \pm 19,0
Диастолическое артериальное давление, $M\pm SD$, мм рт. ст. / <i>Diastolic blood pressure, M\pmSD, mmHg</i>	78,8 \pm 11,6
Частота сердечных сокращений, $M\pm SD$, уд. в мин. / <i>Heart rate, M\pmSD, bpm</i>	74,5 \pm 10,6
Факторы риска / <i>Risk factors</i>	
Курение, n (%) / <i>Smoking, n (%)</i>	63 (37,5)
Употребление алкоголя, n (%) / <i>Alcohol consumption, n (%)</i>	7 (4,2)

Таблица составлена авторами по собственным данным / The table is prepared by the authors using their own data

Примечание. Двойная антитромбоцитарная терапия включает ацетилсалициловую кислоту и ингибиторы P2Y12-рецепторов тромбоцитов.
Note. Dual antiplatelet therapy includes aspirin and P2Y12 receptor inhibitors.