

Дополнительная информация | Additional information

<https://doi.org/10.30895/2312-7821-2026-549-tab1>

Таблица S1. Характеристика пациентов с психосоматической патологией (с детализацией по подгруппам среди принимавших психофармакотерапевтические препараты)

Table S1. Characteristics of patients with psychosomatic pathology (with details by subgroups among those receiving psychopharmacotherapy)

Характеристики групп <i>Group characteristics</i>	Сравнение основных показателей в группах <i>Comparison of main parameters in groups</i>			Распределение пациентов с ПФТ по получаемому препарату <i>Distribution of patients with PFT by the drug received</i>				
	без ПФТ <i>without PFT</i> n=352	с ПФТ <i>with PFT</i> n=498	p-value	АПП <i>APPs</i> n=270	АДП <i>ADPs</i> n=56	ПЭП <i>AEDs</i> n=94	АНК <i>ANXs</i> n=15	ПП <i>APDs</i> n=63
Демографические характеристики / <i>Demographic parameters</i>								
Возраст, лет / <i>Age, years</i> Me [IQR] n=850	67,00 [47,00; 81,00]	61,00 [45,00; 76,00]	U test 0,066	65,00 [47,00; 78,00]	68,00 [56,00; 77,00]	46,00 [34,00; 57,00]	65,50 [51,50; 78,50]	56,50 [41,00; 74,00]
Женщины / <i>Women</i> чел./pers. (%) n=419	204 (58,0)	215 (43,2)	χ^2 0,206	116 (43,0)	15 (26,8)	38 (40,4)	7 (46,7)	39 (61,9)
Мужчины / <i>Men</i> чел./pers. (%) n=431	148 (42,0)	283 (56,8)		154 (57,0)	41 (73,2)	56 (59,6)	8 (53,3)	24 (38,1)
ИМТ / <i>BMI</i> Me [IQR]	23,51 [21,61; 26,01]	23,44 [21,48; 26,28]	U test 0,829	23,39 [21,51; 26,12]	22,95 [22,04; 27,89]	22,66 [20,50; 26,16]	23,12 [22,47; 26,48]	23,54 [21,87; 27,45]
Длительность госпитализации / <i>Hospital stay duration</i> Me [IQR]	11,00 [6,00; 18,00]	11,00 [6,00; 19,00]	U test 0,853	11,00 [6,00; 18,00]	9,00 [5,00; 15,00]	14,00 [8,00; 24,00]	12,00 [7,00; 20,00]	10,00 [6,00; 17,00]
Летальность / <i>Mortality</i> чел./pers. (%)	50 (14,2)	67 (13,5)	χ^2 0,081	40 (14,8)	5 (8,9)	12 (12,8)	1 (6,7)	9 (14,3)
Общесоматическая патология / <i>General somatic pathology</i>								
Последствия ОНМК, ЦВБ, ХИГМ / <i>Sequelae of stroke, CVD, CCHI</i> чел./pers. (%) n=506	290 (82,4)	216 (42,7)	χ^2 0,061	140 (51,9)	14 (25,0)	27 (28,7)	7 (46,7)	28 (44,4)
Наличие ССЗ / <i>Presence of CVD</i> чел./pers. (%) n=504	290 (82,4)	214 (42,5)	χ^2 0,054	137(50,7)	14 (25,0)	28 (29,8)	7 (46,7)	28 (44,4)
ХСН / <i>CHF</i> чел./pers. (%) n=88	57 (16,2)	31 (6,2)	χ^2 0,19	19 (7,0)	1 (1,8)	5 (5,3)	0 (0)	6 (9,5)
Сахарный диабет / <i>Diabetes mellitus</i> чел./pers. (%) n=107	69 (19,6)	38 (7,6)	χ^2 0,107	24 (8,9)	2 (3,6)	3 (3,2)	0 (0)	9 (14,3)
ХБП / <i>CKD</i> чел./pers. (%) n=133	82 (23,3)	51 (10,2)	χ^2 0,21	36 (13,3)	3 (5,4)	6 (6,4)	1 (6,7)	5 (7,9)
ТГВНК, ТЭЛА / <i>DVT, PE</i> чел./pers. (%) n=138	57 (16,2)	81 (16,3)	χ^2 0,080	45 (16,7)	15 (26,8)	11 (11,7)	2 (13,3)	8 (12,7)
Травма / <i>Trauma</i> чел./pers. (%) n=291	161 (45,7)	130 (26,1)	χ^2 0,052	73 (27,0)	4 (7,1)	31 (33,0)	5 (33,3)	17 (27,0)
Анемия / <i>Anemia</i> чел./pers. (%) n=64	43 (12,2)	21 (4,2)	χ^2 0,147	16 (5,9)	1 (1,8)	2 (2,1)	0 (0)	2 (3,2)

Продолжение таблицы S1

Table S1 (continued)

Характеристики групп <i>Group characteristics</i>	Сравнение основных показателей в группах <i>Comparison of main parameters in groups</i>			Распределение пациентов с ПФТ по получаемому препарату <i>Distribution of patients with PFT by the drug received</i>				
	без ПФТ <i>without PFT</i> n=352	с ПФТ <i>with PFT</i> n=498	p-value	АПП <i>APPs</i> n=270	АДП <i>ADPs</i> n=56	ПЭП <i>AEDs</i> n=94	АНК <i>ANXs</i> n=15	ПП <i>APDs</i> n=63
ЖКБ / <i>Cholelithiasis</i> чел./pers. (%) n=13	7 (2,0)	6 (1,2)	χ^2 0,785	4 (1,5%)	0 (0)	0 (0)	2 (13,3)	0 (0)
МКБ / <i>Urolithiasis</i> чел./pers. (%) n=5	3 (0,9)	2 (0,4)	χ^2 1	2 (0,7)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Инфекционные осложнения / <i>Infectious complications</i>								
Пневмония / <i>Pneumonia</i> чел./pers. (%) n=237	104 (43,9)	133 (56,1)	χ^2 0,743	72 (26,7)	6 (2,2)	31 (11,5)	5 (1,9)	19 (7,0)
ИМПв / <i>UTI</i> чел./pers. (%) n=63	28 (44,4)	35 (55,6)	χ^2 0,816	20 (31,7)	3 (4,8)	6 (9,5)	2 (3,2)	4 (6,3)
ИАИ / <i>IAI</i> чел./pers. (%) n=43	23 (53,5)	20 (46,5)	χ^2 0,263	11 (25,6)	2 (4,7)	2 (4,7)	3 (7,0)	2 (4,7)
ИЛОР / <i>ENT infection</i> чел./pers. (%) n=10	5 (50,0)	5 (50,0)	χ^2 1	2 (20,0)	1 (10,0)	1 (10,0)	0 (0)	1 (10,0)
ИЧЛО / <i>Maxillofacial infection</i> чел./pers. (%) n=54	29 (53,7)	25 (46,3)	χ^2 0,61	13 (24,1)	3 (5,6)	6 (11,1)	1 (1,9%)	2 (3,7)
ИКМТ / <i>SSTI</i> чел./pers. (%) n=27	14 (51,9)	13 (48,1)	χ^2 0,995	7 (25,9)	1 (3,7)	2 (7,4)	1 (3,7)	2 (7,4)
Инфекции ЦНС / <i>CNS infections</i> чел./pers. (%) n=4	2 (50,0)	2 (50,0)	χ^2 1	1 (25,0)	1 (25,0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Сопутствующая лекарственная терапия / <i>Concomitant drug therapy</i>								
ИПП / <i>PPI</i> чел./pers. (%) n=428	206 (58,5)	222 (44,6)	χ^2 0,774	128 (47,4)	22 (39,3)	28 (29,8)	12 (80,0)	32 (50,8)
АГП / <i>Antihypertensive drugs</i> чел./pers. (%) n=381	281 (79,8)	270 (54,2)	χ^2 0,8	166 (61,5)	17 (30,4)	45 (47,9)	10 (66,7)	32 (50,8)
Статины / <i>Statins</i> чел./pers. (%) n=134	76 (21,6)	58 (11,6)	χ^2 0,72	33 (12,2)	6 (10,7)	6 (6,4)	3 (20,0)	10 (15,9)
Диуретики / <i>Diuretics</i> чел./pers. (%) n=88	50 (14,2)	38 (7,6)	χ^2 0,067	23 (8,5)	3 (5,4)	6 (6,4)	1 (6,7)	5 (7,9)
АТП / <i>Antiplatelet drugs</i> чел./pers. (%) n=77	41 (11,6)	36 (7,2)	χ^2 0,89	22 (8,1)	4 (7,1)	3 (3,2)	3 (20,0)	4 (6,3)
ПОАК / <i>DOACs</i> чел./pers. (%) n=67	35 (9,9)	40 (8,0)	χ^2 0,91	24 (8,9)	5 (8,9)	7 (7,4)	0 (0)	4 (6,3)

Продолжение таблицы S1

Table S1 (continued)

Характеристики групп <i>Group characteristics</i>	Сравнение основных показателей в группах <i>Comparison of main parameters in groups</i>			Распределение пациентов с ПФТ по получаемому препарату <i>Distribution of patients with PFT by the drug received</i>				
	без ПФТ <i>without PFT</i> n=352	с ПФТ <i>with PFT</i> n=498	p-value	АПП <i>APPs</i> n=270	АДП <i>ADPs</i> n=56	ПЭП <i>AEDs</i> n=94	АНК <i>ANXs</i> n=15	ПП <i>APDs</i> n=63
ПГГП / <i>Oral hypoglycemic agents</i> чел./pers. (%) n=36	21 (6,0)	15 (3,0)	χ^2 0,77	10 (3,7)	1 (1,8)	1 (1,1)	0 (0)	3 (4,8)
Амиодарон / <i>Amiodarone</i> чел./pers. (%) n=17	13 (3,7)	4 (0,8)	χ^2 0,051	1 (0,4)	1 (1,8)	0 (0%)	0 (0)	2 (3,2)

Таблица составлена авторами по собственным данным / The table was prepared by the authors using their own data

Примечание. ПФТ – психофармакотерапия; АПП – антипсихотические препараты; АДП – антидепрессанты; ПЭП – противозепитические препараты; АНК – анксиолитики; ПП – противопаркинсонические препараты; U test – U-критерий Манна-Уитни; χ^2 – критерий Пирсона; ИМТ – индекс массы тела; ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания; ХСН – хроническая сердечная недостаточность; ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения; ЦВБ – цереброваскулярная болезнь; ХИГМ – хроническая ишемия головного мозга; ХБП – хроническая болезнь почек; МКБ – мочекаменная болезнь; ТГВНК, ТЭЛА – тромбоз глубоких вен нижних конечностей, тромбоэмболия легочной артерии; ИМП – инфекция мочевыводящих путей; ИАИ – интраабдоминальная инфекция; ИЧЛО – инфекция челюстно-лицевой области; ИЛОР – инфекция ЛОР-органов; ИКМТ – инфекция кожи и мягких тканей; ЦНС – центральная нервная система; ИПП – ингибиторы протонной помпы; АГП – антигипертензивные препараты; АТП – антитромбоцитарные препараты; ПОАК – пероральные антикоагулянты; ПГГП – пероральные гипогликемические препараты.

Note. PFT, psychopharmacotherapy; APPs, antipsychotics; ADPs, antidepressants; AEDs, antiepileptics/anticonvulsants; ANXs, anxiolytics; APDs, antiparkinsonian drugs; U test, Mann-Whitney U test; Pearson's χ^2 test; BMI, body mass index; CVD, cardiovascular diseases; CHF, chronic heart failure; Stroke/ACVA, acute cerebrovascular accident; CVD, cerebrovascular disease; CCHI, chronic cerebral ischemia; CKD, chronic kidney disease; urolithiasis/nephrolithiasis; DVT, deep vein thrombosis (of lower extremities); PE, pulmonary embolism; UTI, urinary tract infection; IAI, intra-abdominal infection; SSTI, skin and soft tissue infection, maxillofacial infection; ENT infection, ear, nose, throat infection; CNS, central nervous system; PPI, proton pump inhibitors, antihypertensive drugs, antiplatelet drugs; DOACs, direct oral anticoagulants, oral hypoglycemic agents / oral antidiabetic drugs.

Для цитирования: Андержанова А.А., Мазус В.А., Журавлева М.В., Сереброва С.Ю., Яковлев С.В., Мелёшкина Ю.А., Лукина М.В., Балалаева М.А. Влияние психофармакотерапии на маркеры системной воспалительной реакции у пациентов психосоматического профиля: ретроспективное исследование. *Безопасность и риск фармакотерапии*. 2026;14(2):155–167. <https://doi.org/10.30895/2312-7821-2026-549>

For citation: Anderzhanova A.A., Mazus V.A., Zhuravleva M.V., Serebrova S.Yu., Yakovlev S.V., Meleshkina Yu.A., Lukina M.V., Balalaeva M.A. Impact of psychopharmacotherapy on systemic inflammatory markers in psychosomatic patients: A retrospective study. *Safety and Risk of Pharmacotherapy*. 2026;14(2):155–167. <https://doi.org/10.30895/2312-7821-2026-549>